

胡列也吐的鹤类

胡列也吐位于内蒙古自治区呼伦贝尔盟陈巴尔虎旗境内，海拉尔市西北部 120 km。地理位置在东经 49°48′，北纬 118°27′，中俄边境地区。总面积 40 km²。该区地势平坦，既有广阔的草原又有大面积的浅水湖泡和芦苇沼泽。在胡列也吐共有 5 个面积较大的泡子由西向东一字排列。本地区因地处中俄边境，人为干扰很小，区内仅有十几户牧民，无任何污染。此区水丰草肥，食物丰富，还有大片的苇塘，为水禽提供了良好的觅食地和隐蔽场所。每年均有数十万只水鸟来此栖息繁衍。亦是鹤类的最佳栖息地。1998 年 1 月~9 月笔者对该地进行了为期 4 个月的考察。考察中共统计到鹤类 4 种计 78 只。

白头鹤 (*Grus monacha*) 在胡列也吐为夏候鸟。6 月 23 日下午 16:00 在距胡列也吐东北 7 km 处的草原上发现了 47 只白头鹤，分成 3 群悠然自得地在草原上觅食，游荡。这 3 群分别为 4、19 和 24 只。每群之间的距离均为 2 km 以上。每个大群又由数个小群组成，19 只的白头鹤群是由 4 个小群构成的。个体数量分别为 3、8、7 和 1 只。每个小群之间的距离为 200~1 000 m。个体之间的距离为 5~100 m。每个大群最外端两只鹤之间的距离达 3 km。当笔者乘吉普车向鹤群靠近时，吉普车最近可靠近鹤群 50 m 左右。由于吉普车的冲击，鹤群向北移动了约 2 km，3 群鹤合成 1 群。群体内个体间的距离缩小。当吉普车再向鹤群靠近时，鹤群在吉普车距其 1 km 时，纷纷向北飞离。在回来的路上，在湖泡中 1 群 5 只白头鹤又飞

起也向北飞去。6 月 25~30 日笔者又分别见到了 24、22 和 11 只的白头鹤集群。通过观察未发现该群内有雏鸟，只有 5~8 只为亚成体。

丹顶鹤 (*Grus japonensis*) 在胡列也吐为夏候鸟。每年均有繁殖个体。4 月 21 日在胡列也吐三泡子北岸发现 4 只迁徙群，4 只均为成体，在泡子的浅水处觅食。6 月 24 日在三泡子北岸发现 2 只丹顶鹤 (1 成 1 幼)，每日到北岸长有稀疏水草、水深在 5~20 cm 的泥滩中觅食。直到 7 月份因阴雨连绵，它们才迁往他处。9 月份迁徙期见丹顶鹤 2 群 5 只，分别为 1 成，2 成 2 幼。

白枕鹤 (*Grus vipio*) 本区未见有白枕鹤繁殖。只是在秋季迁徙季节见一群 4 只白枕鹤在四泡子东岸浅水草甸觅食，4 只鹤均为成体。当笔者乘吉普车向它们靠近约 1 km 时，它们由东岸飞到西岸，这群鹤在本区停留 3 d 后飞离。

灰鹤 (*Grus grus*) 在本区有分布，但数量极少。据当地牧民讲每年春季迁徙季节可见 5~10 只，但近 1~2 年未见。笔者在考察中亦未见到灰鹤。

蓑羽鹤 (*Anthropoides virgo*) 在鹤类中是体型最小的种类，在呼伦贝尔亦属最常见的鹤类。笔者曾于 1987 年 8 月在新巴尔虎左旗新宝力格东苏木见到 1 100~1 150 只的集群。但在胡列也吐数量则很少，仅在春天迁徙季节见到 2 群 11 只 (4 只和 7 只)。

关键词：胡列也吐，鹤类

中图分类号：Q959.726

李晓民

(东北林业大学野生动物资源学院 哈尔滨 150040)